

## **INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND CENTRELE DE EVALUARE SI TESTAREA PERSOANELOR SIMPTOMATICE**

### **• Unde ma pot testa daca am simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2?**

Persoanele cu simptomologie specifică pentru COVID-19 în conformitate cu definiția de caz elaborată și actualizată de Institutul Național de Sănătate Publică se pot adresa:

- a) medicului de familie;**
- b) unui laborator care efectuează teste pentru detecția virusului SARS-CoV-2, prin NAAT/RT-PCR, respectând algoritmul de testare sau prin utilizarea testelor antigenice rapide;**
- c) la o farmacie care efectuează teste rapide pentru detecția virusului SARS-CoV-2;**
- d) sistemului național unic pentru apeluri de urgență 112\*;**
- e) camerei de gardă a unui spital (UPU/CPU).**

\* Persoanele vor aștepta ambulanța la adresa comunicată, urmând ca echipajul serviciului de ambulanță județean/sau a municipiului București și Ilfov să evalueze pacientul și să recolteze test pentru detecția virusului SARS-CoV-2.

### **• Confirmarea diagnosticului de COVID-19**

Confirmarea diagnosticului COVID-19 se face prin obținerea unui rezultat pozitiv la teste **NAAT/RT-PCR** sau la **teste antigenice rapide** în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic), aşa cum este precizat în Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de Institutul Național de Sănătate Publică.

Pacienții simptomatici cu rezultat negativ la testul antigenic rapid care prezintă simptome sugestive pentru infecția cu SARS-CoV-2 conform definiției de caz vor fi retestați prin NAAT/RT-PCR. Pacienții simptomatici și cu imagine radiologică/CT sugestivă, fără altă cauză aparentă, sunt asimilați pacienților COVID-19, vor fi ținuți în izolare și li se va efectua un alt test NAAT/RT-PCR la interval de circa 24 de ore de la primul test.

**!!! Pentru pacienții care prezintă un rezultat pozitiv la testarea pentru detectia virusului SARS-CoV-2 nu se poate infirma diagnosticul COVID-19 ca urmare a rezultatului negativ al unui alt test.**

### **• Pentru cate zile va trebui sa fiu in izolare la domiciliu?**

- a) Pacienții asimptomatici vor fi izolați la domiciliu și monitorizați prin medicul de familie pentru o perioadă de **10 zile pentru persoanele nevaccinate și 7 zile pentru cele vaccinate sau trecute prin boală în perioada ultimelor 180 de zile**.**
- b) Pacienții simptomatici vor fi evaluati clinic de către medical de familie și, după caz, imagistic și biologic de medicii specialist din centrele de evaluare.**
- c) Pacienții simptomatici vor fi izolați, în funcție de deciziile luate în evaluare la domiciliu/unitatea sanitată care asigură asistența medicală a pacienților cu COVID-19, pentru o perioadă de **10 zile pentru persoanele nevaccinate și 7 zile pentru cele vaccinate sau cele trecute prin boală în perioada ultimelor 180 de zile**.**

- **Cine se poate prezenta la centrele de evaluare?**

La centrele de evaluare se pot prezenta doar persoanele cu un rezultat pozitiv.

- **Ce sunt centrele de evaluare?**

Centrele de evaluare sunt unități funcționale organizate la nivelul spitalelor având ca structură minimă: cabinet de consultații și tratament și/sau structură de spitalizare de zi, după caz, laborator de analize medicale și laborator de radiodiagnostic (aparate pentru radiografie sau tomografie computerizată).

La nivelul centrului de evaluare are loc:

1. Evaluarea clinică a pacientului: simptome, evaluare puls arterial, saturăția sângei cu O<sub>2</sub>, tensiune arterială, temperatură, greutate;
2. Identificarea factorilor de risc:
  - boli cardiovasculare, inclusiv HTA;
  - diabet zaharat tip 1 și 2;
  - obezitate cu indice de masă corporală peste 30%;
  - boli respiratorii cronice, inclusiv astmul bronșic;
  - insuficiență renală cronică, pacienții cu dializă cronică;
  - hepatopatii cronice;
  - imunodepresii semnificative, inclusiv boli neoplazice, transplant de organ sau de celule stem, talasemie, anemie falcipară, terapie imunosupresoare sau SIDA;
  - vârstă peste 65 de ani;
  - copiii de 12—17 ani cu patologii severe asociate;
3. evaluarea antecedentelor personale patologice/medicație pentru afecțiuni cronice, dacă este cazul;
4. interpretarea rezultatelor de laborator și rezultate imagistice (pentru pacienții care sunt evaluati în centrele de evaluare).

- **Decizii în urma evaluării:**

1. Pacienții pozitivi fără factori de risc care au manifestări clinice ușoare COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie, vor fi izolați la domiciliu pentru o perioadă de 10 zile pentru persoanele nevaccinate și 7 zile pentru cele vaccinate sau trecute prin boală în perioada ultimelor 180 de zile și tratați și monitorizați la domiciliu prin intermediul medicului de familie.
2. Pacienții pozitivi fără factori de risc care au manifestări clinice medii COVID-19, care nu necesită oxigenoterapie, vor fi izolați la domiciliu pentru o perioadă de 10 zile pentru persoanele nevaccinate și 7 zile pentru cele vaccinate sau trecute prin boală în perioada ultimelor 180 de zile și vor fi monitorizați ulterior la domiciliu prin intermediul medicului de familie.

- **Sunt în izolare la domiciliu. În ce situație trebuie să ma prezint la un centru de evaluare?**

Pacienții cu COVID-19 monitorizați la domiciliu vor fi îndrumați de urgență pentru investigare în centrele de evaluare (lista acestora va fi publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății și a direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București) în vederea internării/inițierii tratamentului specific, prin intermediul serviciului 112, în situația existenței următoarelor simptome:

- febră înaltă persistentă mai mult de 5 zile sau care reapare după o perioadă de afebrilitate;
- tuse seacă intensă sau care se accentuează;
- $\text{SaO}_2 < 94\%$  la pacientul fără afectări respiratorii anterioare COVID-19;
- dispnee nou apărută sau accentuarea unei dispnei preexistente;
- dureri toracice la inspirul profund;
- astenie marcată;
- mialgii intense.

Pacienții care nu necesită oxigenoterapie care au manifestări clinice ușoare sau medii de COVID-19 și care au factori de risc vor fi direcționați prin intermediul serviciului 112 sau **se vor deplasa individual, cu evitarea utilizării transportului în comun, pentru a fi evaluati în centrele de evaluare (lista acestora este publicata pe site-ul DSP)**, pentru a se decide dacă au indicații/contraindicații de administrare de medicație antivirală și dacă necesită internare de zi sau continuă.

- **Administrarea de anticorpi monoclonali și antivirale**

Antiviralele de administrare orală se pot prescrie pentru administrare la domiciliu doar dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

- se inițiază la pacienți în primele 7 zile de boală (faza virală a bolii);
- sunt prescrise de către medicul care a evaluat pacientul, după evaluare corespunzătoare pentru excluderea contraindicațiilor: clinică, biologică, imagistică;
- continuarea monitorizării pacientului de către medicul de familie pe parcursul tratamentului și ulterior până la vindecare.

**Antiviralele orale se administrează în regim ambulatoriu, doar pe bază de prescripție medicală. În schimb, medicația antivirală cu administrare parenterală se utilizează doar în mediul spitalicesc.**

**Anticorpii monoclonali pot fi administrați în centrele de evaluare în regim de spitalizare de zi.**

- **Pentru cine este necesara internarea in spital?**

**a)** pacienții care prezintă semne de agravare legate de infecția cu SARS-CoV-2, respectiv simptomele menționate la punctul 2, sau nu prezintă semne de agravare legate de infecția SARS-CoV-2, dar au o decompensare a bolii de fond în timpul monitorizării la domiciliu.

**b)** pacienții care necesită oxigenoterapie, care au manifestări severe de COVID-19 sau cei care necesită suport al unei/mai multor funcții vitale și/sau au sepsis/șoc septic (cu stare critică). Excepție vor face doar cei care vor refuza internarea, refuz exprimat în scris, în pofida informării privind riscurile evolutive;


**c)** pacienții care nu au manifestări severe determinante de COVID-19, dar care au alte afecțiuni care impun asistență spitalicească din cauza imposibilității acestora de a fi tratați și monitorizați eficient la domiciliu.

- **Reguli igienice și îndrumări pentru persoanele carantinează/izolate**

Persoanele aflate în carantină/izolare, precum și familiile/persoanele din aceeași locuință sau gospodărie trebuie să respecte următoarele reguli igienice și îndrumări:

- persoana carantinează/izolată se va plasa într-o cameră individuală, bine aerisită (de exemplu, aer condiționat sau aerisirea cu geamurile deschise);
- persoana carantinează/izolată își limitează deplasările prin casă, evitând să circule prin spațiile comune (de exemplu: bucătărie, baie), spații ce vor fi bine aerisite prin deschiderea geamurilor;
- este necesar ca membrii familiei să stea în alte camere sau, dacă acest lucru nu este posibil, să păstreze o distanță de cel puțin 1 m față de persoana izolată (de exemplu, să doarmă într-un pat separat);
- igiena mâinilor trebuie să fie riguroasă, înainte și după prepararea mâncării, înainte de a mâncă, după folosirea toaletei și ori de câte ori mâinile par murdare. Dacă mâinile nu sunt vizibil murdare, se poate folosi un dezinfecțant de mâini pe bază de alcool. Pentru mâini vizibil murdare, se recomandă apă și săpun;
- când se efectuează spălarea pe mâini cu apă și săpun, se folosesc, de preferat, prosoape de hârtie de unică folosință pentru a usca mâinile. Dacă acestea nu sunt disponibile, se utilizează prosoape obișnuite curate și vor fi înlocuite atunci când se udă sau cât mai des posibil;
- lenjeria și ustensile de masă dedicate se folosesc doar de către persoanele izolate; aceste articole trebuie curățate cu apă și detergenți obișnuiți după utilizare și pot fi reutilizate;
- suprafețele care sunt frecvent atinse în cameră în care este izolată persoana, cum ar fi: noptierele, cadrul patului și alte piese de mobilier pentru dormitor, se curăță și se dezinfecțează zilnic;
- suprafețele băilor și toaletelor se curăță și se dezinfecțează cu un dezinfecțant obișnuit pe bază de clor cel puțin o dată pe zi;
- hainele, lenjeria de pat și prosoapele de baie și de mâini ale persoanei izolate se curăță cu detergent obișnuit, folosind mașina de spălat la 60—90°C, și vor fi uscate bine;
- atunci când strănută sau tușesc, persoanele izolate/carantinează își acoperă gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau strănută/tușesc în plica cotului. Șervețelul de unică folosință se aruncă imediat la gunoi, în sac de plastic, urmat de spălarea imediată a mâinilor cu apă și săpun. În cazul în care apare cel puțin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultăți la respirație, durere în gât, se va contacta sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112.

## Algoritmul de parcurs al pacientului cu simptomatologie specifică COVID-19



*Pentru mai multe informații, va rugam sa accesati ordinul MS nr. 35/09.01.2022, privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 1513/2020.*